

CHIRURGIE ORALE

POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE Porte Chézine
Avenue Claude Bernard BP 40419 44819 SAINT-HERBLAIN Cedex
Tél 02 40 95 82 77 Fax 02 40 95 81 70 Urgences 02 40 95 94 91 www.drguyot.fr

Dr Michel GUYOT

Docteur en Chirurgie Dentaire

Docteur en Médecine (non inscrit)

Ancien Interne des Hôpitaux de Nantes

Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire

*du Centre de Soins, d'Enseignement et de Recherche Dentaires
du CHU de Nantes*

DU de Chirurgie et Prothèses Implantologiques (Paris V)

DU de Dermatologie de la Muqueuse Buccale (Paris V)

DU d'Expertise Maxillo-Faciale et Bucco-Dentaire (Montpellier I)

DU de Sédation Consciente (Clermont-Ferrand I)

Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales (Pharmacologie)

Spécialiste Qualifié en CHIRURGIE ORALE

N°RPPS : 10000873371



Société Française de Chirurgie Orale

INFORMATION MÉDICALE CONCERNANT LES SOINS BUCCO-DENTAIRES EN CAS DE PRISE DE BISPHOSPHONATES ET APPARENTES

- Vous allez recevoir un traitement par Bisphosphonates (BP), ou
- Vous êtes traité par BP et devez bénéficier d'un geste chirurgical oral (par exemple une extraction dentaire) ou bien,
- Vous avez été exposé à ce type de traitement.

Il est important dans ce contexte que vous ayez connaissance des recommandations afin de réduire le risque de survenue d'une nécrose de l'os de la mâchoire (ONM).

► **Le risque de survenue d'une ONM** est faible mais ne doit pas être sous-estimé. Toutefois, il peut être augmenté selon le type de médicament prescrit mais aussi par un état bucco-dentaire altéré. Certains problèmes médicaux ou la prise de médicament(s) associé(s) peuvent accentuer le risque de survenue d'ONM.

► **Pour réduire ce risque avant de débiter le traitement par BP, puis durant le traitement par BP, il vous faut préserver un bon état bucco-dentaire** (détartrage, soins de caries, extractions dentaires éventuelles). Des mesures d'hygiène rigoureuses sont indispensables pour réduire au maximum ce risque.

► **Le risque de survenue d'une ONM est quasiment inexistant pour la plupart des soins dentaires courants** (détartrage, soins de caries, dévitalisation). Il peut être toutefois augmenté par un acte chirurgical portant sur les os des mâchoires. C'est pourquoi votre praticien respectera un protocole spécifique pour minimiser ce risque. Après l'acte chirurgical, un suivi est indispensable afin de vérifier la cicatrisation de la zone opérée. Le praticien est seul habilité à indiquer l'arrêt éventuel du traitement antibiotique en fonction de cette cicatrisation et de votre état général.

► **La surveillance bucco-dentaire** est annuelle en cas de prise de médicaments antirésorbants par voie orale, et semestrielle en cas de voie intra-veineuse.

► **Vous devez contacter votre Chirurgien Dentiste ou votre Médecin en présence des signes suivants**: dent mobile, inflammation de la muqueuse gingivale, mauvaise odeur dans la bouche, impression d'épine osseuse.

En cas de complications, il est conseillé de prendre contact avec votre chirurgien.

Dans le cadre de la consultation, il vous a été exposé les risques et les effets secondaires inhérents à l'acte opératoire en relation avec votre traitement.

Information reçue et bien comprise.

Date et Signature du patient ou du représentant légal

Signature du praticien

Document à remettre daté signé au plus tard le jour de l'intervention