

## CHIRURGIE ORALE

POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE Porte Chézine  
Avenue Claude Bernard BP 40419 44819 SAINT-HERBLAIN Cedex  
Tél 02 40 95 82 77 Fax 02 40 95 81 70 Urgences 02 40 95 94 91 www.drguyot.fr

### **Dr Michel GUYOT**

#### **Docteur en Chirurgie Dentaire**

*Docteur en Médecine (non inscrit)*

*Ancien Interne des Hôpitaux de Nantes*

*Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire*

*du Centre de Soins, d'Enseignement et de Recherche Dentaires  
du CHU de Nantes*

*DU de Chirurgie et Prothèses Implantologiques (Paris V)*

*DU de Dermatologie de la Muqueuse Buccale (Paris V)*

*DU d'Expertise Maxillo-Faciale et Bucco-Dentaire (Montpellier I)*

*DU de Sédation Consciente (Clermont-Ferrand I)*

*Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales (Pharmacologie)*

#### **Spécialiste Qualifié en CHIRURGIE ORALE**

*N°RPPS : 10000873371*



Société Française de Chirurgie Orale

## **INFORMATION MÉDICALE CONCERNANT LA RADIOTHERAPIE ET LES TRAITEMENTS DE MEDECINE BUCCO-DENTAIRE**

(Version Mars 2018)

Vous avez ou allez bénéficier d'une **radiothérapie de la région bucco-maxillo-faciale**, nous vous recommandons (AFSOS, 2010 ; Haute Autorité de Santé, 2010 ; GPIC, 2011 ; SFCO, 2012, Schweyen et al., 2017) les précautions ci-dessous afin d'éviter les complications bucco-dentaires :

#### ► **Avant le début de la radiothérapie**

- Arrêt complet définitif du tabac et de l'alcool,
- Hygiène stricte : brossage 3 fois par jour après chaque repas avec brosse souple et dentifrice sans menthol de la gencive vers les dents, par un mouvement de balayage,
- Elimination des foyers infectieux au moins 15 jours à 3 semaines avant l'irradiation,
- Eviter d'utiliser une brosse à dents électrique,
- Port d'une gouttière de fluoruration afin de renforcer l'émail de vos dents et prévenir les caries.

#### ► **Pendant la radiothérapie**

- Contrôle de la sécheresse buccale par la prescription de médicaments stimulant la salivation ou de substituts salivaires,
- Prévention et traitement des inflammations des muqueuses orales (mucites) par des bains de bouche avec une solution bicarbonatée (0,14%) voire l'application de gel anesthésique, Prescription si besoin d'antifongiques dont l'utilisation simultanée avec les bains de bouche à la chlorhexidine est déconseillée en raison du risque d'inactivations réciproques,
- Brossage 3 fois par jour des vos prothèses dentaires,
- Brossage de vos dents avec une brosse souple,
- Séances de kinésithérapie pour parer à la limitation d'ouverture buccale,
- Eventuels conseils diététiques.

#### ► **Après la radiothérapie**

- Contrôle semestriel chez le chirurgien dentiste traitant pour contrôle bucco-dentaire,
- Détartrages réguliers,
- En cas d'extraction, prévention de l'ostéoradionécrose par une antibioprophylaxie en fonction des doses et champs d'irradiation,
- Poursuite de la fluoroprophylaxie (port de gouttière de fluoruration au moins 15 minutes le soir) tant que votre praticien le juge nécessaire.

► **Contactez le chirurgien-dentiste ou l'oncologue en présence des signes suivants** : irritation buccale anormale persistante, dent mobile, inflammation, saignement gingival, mauvaise odeur dans la bouche, impression d'épine osseuse.

**Dans le cadre de la consultation, il vous a été exposé, les risques et les effets secondaires inhérents à l'acte opératoire en relation avec votre traitement.**